



白内障の処置・治療



＜核硬化症＞
治療対象ではない

＜先天性白内障＞
治療対象ではない
経過観察




＜初発白内障＞

＜未熟白内障＞

内科的治療

- 点眼
 - ピレノキシン点眼液
1回1～2滴、1日3～5回
 - グルタチオン点眼液
1回1～2滴、1日3～5回
- 内服
 - 唾液腺ホルモン剤投与
 - 八味地黄丸投与



＜成熟白内障＞


＜過熟白内障＞
(モルガニー白内障)

外科的治療

- 水晶体摘出手術
 - 嚢内摘出術
 - 嚢外摘出術
超音波吸引法
専門医に紹介する
- 人工水晶体挿入術
専門医に紹介する

水晶体摘出手術（超音波吸引法）


人工水晶体挿入術



小野憲一郎（東京大学）・工藤莊六（工藤動物病院）

白内障（Cataract）

白内障とは、何らかの原因で水晶体が混濁・白濁した状態をいいます。
白内障は角膜疾患に次いで多い眼疾患（23%）で、遺伝的要因、老化、糖尿病などによって引き起こされます。



稟告
家族歴、犬種
病歴など

発症年齢

水晶体の検査
白濁の部位
病期

家族歴（親、同腹犬 など） 犬種（好発犬種？）

先天性・遺伝性が推測 後天性が推測 不明

出生～開眼時 若齢（＜2 Y） 壮齢（2-6 Y） 老齢（8 Y＜）

前嚢 前部皮質 核 後部皮質 後嚢

初発期 未熟（膨張）期 成熟期 過熟期


過熟白内障（収縮性） 過熟白内障（モルガニー） 過熟白内障（吸収性）

さわやか
SENJU

千寿製薬株式会社
大阪市中央区平野町二丁目5番8号



作成日 2010年3月

臨床的には、発症機序（先天性か、後天性か）、発症年齢、病期による分類が治療方針を決定する上で良いと思われます





核硬化症




発症機序による分類



先天性白内障




後天性白内障
(糖尿病性白内障)






老年性
白内障



病気による分類





初発白内障



未熟白内障



成熟白内障



過熟白内障
(モルガニー白内障)



過熟白内障
(吸収性)