

目薬のさし方

目薬をさす時の注意

- 1.指示された使用方法(用法・用量等)を正確に守って、使用してください。
- 2.目薬の容器の先が目に触れないようにしてください。
- 3.数種類の目薬を使う場合は、間隔を5～10分あけてください。

◎動物をフローアーにおいたまま目薬をさすのは困難です。
抱きかかえるか、あるいは食卓などの台に乗せて動かさないように保定します。

- ①あごの下に片方の手を添えて、顔を上に向け、親指と人さし指で目薬を持ち、残りの指で上まぶたを開きます。



- ②目薬の容器が犬の視界に入らないように後ろから1～2滴さします。



瞳シリーズVI

犬猫の目の病気



輝く瞳のために！

緑内障

千寿製薬株式会社 大日本住友製薬株式会社
日本獣医眼科協議会監修

目のチェックポイント

あなたのワンちゃん、ネコちゃんの目は大丈夫？
日頃よりワンちゃん、ネコちゃんの目のチェックを！

左右の目の大きさに違いはありませんか？ ☐

物にぶつかったり階段を踏み外すことはありませんか？ ☐

目を細くしてまぶしそうにしていますか？ ☐

まぶたがかすかに震えていますか？ ☐

まぶたが腫れていませんか？ ☐

まつげに異常はありませんか？ ☐

目の周りの毛がぬれていませんか？ ☐

目が乾いていませんか？ ☐

目やにが多くありませんか？ ☐

白目が赤くなっていますか？ ☐

黒目が白く濁っていますか？ ☐


目の中の色(虹彩、水晶体など)に変化はありませんか？ ☐

(一つでも心当たりがあれば当院にご相談ください。)

動物病院名

犬・猫の目が健康であるために

目のしくみ



目の構造はカメラに例えられます。

目の組織一つ一つが物を見るのに重要な役割を果たしています。


緑内障とは

目の中には眼房水という水が入っており、この水の圧力(眼圧)により目の硬さ(張り)や大きさが保たれています。

緑内障とは眼房水が溜まり過ぎ、眼圧が高くなった結果、目の痛みや視覚障害(失明)を起こす病気です。

緑内障への過程

眼房水は毛様体(水道の蛇口)で作られて、隅角(排水口)から排出されており、緑内障は眼房水の排出が悪いために眼圧が上昇して発生します。



緑内障の原因

緑内障は自然発生する場合(原発性緑内障)と他の病気によって発生する場合(続発性緑内障)の2つがあります。原発性緑内障は遺伝の関与が疑われています。続発性緑内障は主にぶどう膜炎や水晶体脱臼などにより二次的に起こります。

緑内障の症状


眼圧上昇による激しい痛みがおこります。症状は白目の強い充血、黒目の白濁(角膜浮腫)、ひとみが広がる(散瞳)などとともに視神経や網膜が障害され視覚が失われます。



緑内障となって眼球が拡大(牛眼)した左眼



眼圧が上昇して白目が充血、ひとみが拡大(散瞳)した緑内障眼



眼圧上昇が持続して水晶体脱臼した緑内障眼

緑内障の診断

目の症状に加え眼圧測定(眼圧上昇)によって診断します。

緑内障の治療は

緑内障は眼圧の上昇により深刻な視覚障害と強い痛みを起こす疾病ですので、早期の治療が必要です。治療は点眼薬や内服薬による内科的治療法が主体となりますが、状況によっては点滴や外科手術を考慮する必要があります。

視覚を失っていて回復の見込みがない場合は、義眼にする処置を行います。